造影検査の説明書（CT・血管造影・DIC 検査）

説明日　　年　　月　　日
説明者

CT 検査・血管造影検査・DIC 検査ではヨード系造影剤を使用して検査する場合があります。造影剤を使用する事により明確な画像を得る事ができます。これにより、病気の質、性状、範囲などを正確に評価できるようになります。
ただし、造影剤を使用することにより、下記に示すような副作用が起こる事もあります。

【CT・血管造影検査　造影剤の副作用頻度】

軽度の症状：50 人に１人（悪心、嘔吐、かゆみ、鼻閉、くしゃみ、じん麻疹など軽く一時的なもの）
重度の症状：25000 人に１人（呼吸困難、血圧低下、ショック症状など）
死亡　　：400000 人に１人

【 DIC 検査　造影剤の副作用の頻度】

軽度の症状：25 人に１人（悪心、嘔吐、発疹、じん麻疹など軽く一時的なもの）
重度の症状：500 人に１人（呼吸困難、痙攣発作、ショック症状など）

検査前の注意!!

- 以前、造影剤を使用されて副作用が起きたことがある方、またはぜんそくやアレルギー体質の方は造影剤の副作用発生頻度が高くなることがあります。
  注）これらの既往がある方は、問診票に必ず記入してください。
  注）場合によっては、当日造影剤は使用できないことがあります。
  注）どうしても、造影剤の使用が必要なときは、事前（12 時間前、２時間前）に、お薬を飲んで頂く場合があり、入院で検査をすることがあります。
- 腎機能が低下した方に造影剤を使用すると、腎機能が悪化することがあります。このため基本的には腎機能が低下した方の造影検査はできません。
  注）腎臓に病気のある方は問診票に必ず記入してください。
  注）採血をして腎臓機能の検査を行うことがあります。結果が出るまで待って頂くことがありますのでご了承ください。
  注）腎機能の状態によっては、点滴をする場合があります。
- 糖尿病（ビグアナイド系の糖尿病薬）の薬を服用されている方は、ヨード系造影剤と併用できないものがあります。
  注）ビグアナイド系糖尿病薬を服用している方は、問診票に必ず記入してください。
  注）検査前２日～検査当日～検査後２日（合計５日間）服用を中止が必要です。

検査時の注意!!

- ＣＴ検査で造影剤を注入するときに体が熱くなる事がありますが、造影剤の一時的な刺激なので心配ありません。
- ＣＴ検査では造影剤を機械で自動的に注入するため、血管外に造影剤が漏れた場合注射した部位が腫れたり、痛みを伴う事があります。ほとんどの場合時間がたてば自然に吸収されるので心配ありませんが、漏れた量が非常に多いと処置が必要となる事があります

裏面へつづく

- 造影剤による副作用は検査中または直後に起こることが多いので、造影剤注入時や注入後に何か異常を感じた場合は、ためらわずに検査担当の看護師・技師に知らせてください。

検査後の注意!!

- 造影剤は主に、尿中より排泄されます。排泄を促すため、検査終了後には水分を多めに摂るようにして下さい。　※水分を制限されている方は、主治医にご確認ください。

- 造影検査終了後、数時間から数日後に副作用症状（嘔吐、かゆみ、じん麻疹など）が出ることがあります。何か異常を感じられた場合には、来院されるか、下記の電話番号までご連絡下さい。

その他の注意!!

- 授乳中の方は、この造影剤を注射後２４～４８時間は授乳を中止する必要があります。

ご理解頂いたうえで、「造影検査問診票（CT・血管造影・DIC 検査）」への記入をお願いします。
上記について、ご理解頂き、検査に同意頂けましたら、「検査・同意書」にご署名をお願いします。
その他、何かご不安な点や、ご不明な点がございましたら、主治医もしくは看護師にご相談ください。

造影検査の説明書（エコー検査）

説明日　　年　　月　　日
説明者

【超音波診断用造影剤（ソナゾイド）の副作用の頻度】

軽度の症状	：2000 人に１人（悪心、嘔吐、発疹、じん麻疹など軽く一時的なもの）
重度の症状	：頻度不明（2009 年３月迄で２例報告）（アナフィラキシー様症状、重度の発疹）
死亡	：０例

注意!!

- 卵または卵製品にアレルギーのある方は、アレルギー症状が発現する場合があるので必ず申し出て下さい。

社会福祉法人恩賜財団広島県済生会
済　生　会　呉　病　院
〒737 - 0821　呉市三条２丁目 1-13
TEL（0823）21-1601

平成 30 年１月改定